




ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Самая заразная: корь

Филиппова Наталья Витальевна

заместитель заведующего отделом
санитарно-гигиенического воспитания и
обучения по вопросам профилактики
инфекционных и паразитарных
заболеваний,

врач-эпидемиолог



«ДЕТСКАЯ ЧУМА»

1067‰

заболеваемость до 1967 г.

подъем заболеваемости
каждые

2-3 года


0,07‰

заболеваемость в 2022 г.

подъем заболеваемости
каждые

4-6 лет

КОРЬ ВЕРНУЛАСЬ?

A pink line graph on a light blue background, showing a fluctuating upward trend. The line starts at the bottom left, rises to a peak, dips slightly, and then rises more steeply towards the top right, ending in an arrowhead pointing towards the right side of the image.

С конца 2022 года
начался очередной
циклический подъем
заболеваемости корью

Этот подъем связан с
накоплением в популяции
лиц, не имеющих
иммунитета к кори

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ



Источник инфекции
Больной человек

Больной становится заразным за
несколько дней до появления
симптомов



Путь передачи
Воздушно-капельный

Вирус выделяется с капельками
слюны во время чихания и кашля

более **90%**


**людей без иммунитета
заболеют корью после
контакта с больным**



Корь
начинается
остро

Симптомы



- температура до 40°C
 - кашель
 - насморк
 - головная боль
 - светобоязнь
 - отечность век
 - пятна Филатова-Коплика
 - сыпь
- 
- 

Лучше
переболеть?
Нет!



5-10%
пневмония



7-9%
отит



0,1%
энцефалит

Подострый склерозирующий панэнцефалит



средний инкубационный период после перенесенной кори — 7-8 лет



чаще встречается у детей, перенесших корь до 2-х лет



первые симптомы неспецифичны, поэтому диагностика затруднена



приводит к необратимой утрате функций и ранней смерти

Плановая вакцинация детей*



в **12** месяцев
вакцинация



в **6** лет
ревакцинация

*Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н

Взрослым тоже нужны прививки*

Кому:

- не привитым,
- не болевшим,
- привитым однократно,
- с неизвестным анамнезом

Прививки против кори
проводят до 35 лет,
декретированным
контингентам – до 55 лет

*Национальный календарь профилактических прививок,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н

Экстренная вакцинация*



в течение
72 часов
при близком
контакте



в течение
7 дней
при отдаленном
контакте

*СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Экстренная вакцинация*



Всем контактным
независимо от возраста:

- не болевшим корью
- не привитым
- не имеющим сведений о прививках
- привитым однократно

Детям, не достигшим прививочного
возраста, вводится иммуноглобулин
человека нормальный не позднее 5-го
дня от момента контакта.

*СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования
по профилактике инфекционных болезней»

ВсемСанПросвет



Благодарю за внимание!

Берегите себя и
будьте здоровы!



cgong.rospotrebnadzor.ru